

T.C
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.km-KOCAELİ

Rapor Tarihi: 28.12.2010 11:51:51

Adı : H. Soyadı : O. Cinsiyeti : Bayan



2 Angulariste üzeri eksudalı polipoid lezyon



7 Lezyon kabartılmış hali



12 Needle knife ile işlem



14 İşlemin sona yakın hali



15 İşlemin sona yakın hali



21 İşlemin son hali

Gastroskopi Raporu

Şikâyeti : Antrumda lezyon
Premedikasyon : Xylocaine sprej + Dormicum 2 mg
Endoskop : Fujinon
Özofagus : Özofagus mukozasının rengi ve yapısı doğaldı. Z çizgisi ön kesici dişlerden itibaren 37.cm'de geçilmekte olup, hemen altında diyafragma kısıncı kasılma göstermektedir.

Mide : Mide fundus, kardiya, korpus ve antrum gözlemlendi. Antrum angulariste daha önce saptanan submukozadan köken aldığı ve ESD ile çıkarılmaya uygun olduğu EUS ile ifade edilen polipoid oluşum görüldü. Lezyonun etrafı endocut ile işaretlenip ESD için hazırlanmış özel solüsyon kullanılarak dibi kabartıldı. İğne ve seramik uçlu bıçaklar kullanılarak lezyonun tüm çevresi kesildi. Daha sonra cap takılarak lezyonun dibi ESD tekniği ile diseke edildi. Lezyona yönelik ESD işlemi yapıldı, komplikasyon olmadı, lezyon tam olarak çıkartıldı. Midenin açlık sekresyonu artmış, hava ile ekspansiyonu normaldi.

Duodenum : Pilor açık, bulbus forme. Bulbus ve postbulber bölge mukozası normal olarak izlenmektedir.

Tanı : **Antrumda Submukozadan Köken Alan Oluşum ve ESD İle Çıkartılması İşlemi Midede ESD İşlemi**

Biyopsi : --

Prof.Dr Ömer ŞENTÜRK



T.C
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ ENDOSKOPİ BÖLÜMÜ

Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.km KOCAELİ
Tel : 0262 303 95 00

3 ay sonraki durum

Rapor Tarihi: 17.03.2011 10:08:32

Adı : H. Soyadı : O. Cinsiyeti : Bayan



2 Özofagus



3 KÖ Bileşke



5 Antrum, angularis (ESD sonrası)



7 Kardiya



12 Postbulber bölge



13 Antrum, angularis (ESD sonrası)

Gastroskopi Raporu

- Şikayeti** : Dispeptik yakınmalar, ESD sonrası kontrol
Premedikasyon : Xylocaine sprej
Endoskop : Fujinon
Özofagus : Özofagus mukozasının rengi ve yapısı doğaldı. Z çizgisi ön kesici dişlerden itibaren 36 cm'de geçilmektedir. Z çizgisinin hemen altında diyafragma kıskacı kasılmaktadır.
Mide : Mide fundus, kardiya, korpus ve antrum gözlemlendi. Antrum mukozası genel olarak eritemli-ödemli olup, yer-yer yüzeysel erozyonlar izlenmektedir. Antrum angulariste daha önce ESD yapılan skatrisyel çekilmeler gösteren mukozal yapı izlenmektedir. Midenin hava ile ekspansiyonu normaldir.
Duodenum : Pilor açık, bulbus forme. Bulbus mukozası normal olup, postbulber bölge mukozası ödemli ve eritemli olarak izlenmektedir.
Tanı : **Eritematöz Antral Gastrit + İyileşmekte Olan ESD Alanı + Duodenit**
Biyopsi : --

Prof.Dr Ömer Şentürk